

گزارش موردی: التهاب و توده در پستان، از عوارض کمیاب مصرف قرص ریسپریدون

زهرا میرسرگزی

کارشناس مامایی

mirsargazizahra@gmail.com

شایسته سلیمی

دکتری حرفه ایی پزشکی

drshayestehsalimi@gmail.com

شقایق سلیمانی پور

Shaghayeghsoli29@gmail.com

محقق و پژوهشگر در حوزه درمان

چکیده :

قرص ریسپریدون یکی از مهم ترین داروها در دسته داروهای روانشناختی است که در گروه داروهای ضد سایکوز جای می گیرد. این دارو جزو داروهای مهم روانپزشکی موثر در اعصاب به شمار می رود که با تشخیص و به تجویز روانپزشک و درمانگر متخصص، قابلیت مصرف و اثربخشی دارد. ریسپریدون همچنین برای درمان و کاهش تحریک پذیری مفرط کودکان در خودمانده (اوتیسم) نیز به کار می رود. اگر چه ناراحتی اصلی را برطرف نمی کند اما در کاهش علائم آزاددهنده موثر است. علائم مثبت (مانند توهم زایی، اختلال فکر) و علائم منفی (مانند انزوا، ناراحتی های احساسی و عاطفی) را رفع می کند. ریسپریدون در مقایسه با دیگر داروهای ضدجنون اثر تسکین بخشی کمتری دارد و ایجاد اختلالات حرکتی خیلی کمتری میکند. گزارش حاضر به ارائه یافته های بالینی و آزمایشگاهی از بیماری التهاب در پستان بیمار مونث و مجردی میپردازد که به مدت 5 سال از سن 18 سالگی تا 23 سالگی به طور متغیر و با تشخیص پزشک اعصاب و روان از این قرص مصرف میکرده و پس از هر دوره طولانی مدت مصرف دچار التهاب در ناحیه پستان و متوجه وجود توده در این ناحیه میشده. نظر به اینکه از جمله عوارض شایع مصرف ریسپریدون افزایش پرولاکتین میباشد. بروز این توده را طبق مشهودات میتوان از عوارض نادر مصرف قرص ریسپریدون دانست.

کلید واژه ها: التهاب پستان، ریسپریدون، عوارض.